



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 36396—2018

## 巴 美 肉 羊

Bamei mutton sheep

2018-06-07 发布

2019-01-01 实施

国家市场监督管理总局  
中国国家标准化管理委员会 发布



## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业农村部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准主要起草单位:内蒙古自治区畜牧工作站、内蒙古自治区巴彦淖尔市家畜改良工作站。

本标准主要起草人:红海、李忠书、李虎山、王海平、陈巴特尔、吴明宏、王文义、田建、郝柱、张瑞琴、李文慧、王文清、刘树军。





# 巴 美 肉 羊

## 1 范围

本标准规定了巴美肉羊的品种来源、品种特征、生产性能和分级鉴定。  
本标准适用于巴美肉羊品种鉴别和等级评定。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 1236 绵、山羊生产性能测定技术规范

## 3 品种来源

以德国肉用美利奴羊为父本,以当地细杂羊为母本,经过杂交培育而成的肉毛兼用型绵羊新品种。主要分布在内蒙古自治区巴彦淖尔市及毗邻地区。

## 4 品种特征

### 4.1 外貌特征

巴美肉羊为肉毛兼用型绵羊品种。体格较大,体质结实,结构匀称;无角,颈部无皱褶(或有1个~2个不明显的皱褶),胸部宽而深,背腰平直,四肢结实,后肢健壮,肌肉丰满,肉用体型明显,呈圆桶型。体形外貌照片参见附录A。

### 4.2 被毛特征

被毛白色,闭合良好,密度适中,细度均匀,以 $21.6\ \mu\text{m}$ ~ $25.0\ \mu\text{m}$ 为主,头部至两眼连线、前肢至腕关节、后肢至飞节均覆盖有细毛。

### 4.3 体重、体尺

12月龄和24月龄巴美肉羊平均体尺体重见表1。

表1 巴美肉羊平均体尺体重表

| 月龄   | 性别 | 体高<br>cm  | 体长<br>cm  | 胸围<br>cm   | 体重<br>kg   |
|------|----|-----------|-----------|------------|------------|
| 12月龄 | 公羊 | 72.0±5.42 | 73.0±5.79 | 105.0±4.55 | 71.0±3.64  |
|      | 母羊 | 67.0±4.71 | 68.0±4.87 | 93.0±5.72  | 51.0±3.03  |
| 24月龄 | 公羊 | 78.0±5.65 | 80.0±5.92 | 115.0±8.63 | 100.0±4.05 |
|      | 母羊 | 70.0±4.24 | 71.0±5.81 | 97.0±6.80  | 61.0±3.24  |

5 生产性能

5.1 产肉性能

12月龄公羊宰前平均活重71 kg,屠宰率50.0%,12月龄母羊宰前平均活重51 kg,屠宰率49.0%;24月龄公羊宰前平均活重100 kg,屠宰率48.0%,24月龄母羊宰前平均活重61 kg,屠宰率47.0%。5月龄前羔羊平均日增重:公羔310 g,母羔290 g;5月龄羔羊平均胴体重:公羔18.0 kg,母羔16.0 kg,屠宰率51.0%。

5.2 产毛性能

12月龄公羊平均剪毛量4.0 kg,母羊平均剪毛量3.3 kg;24月龄公羊平均剪毛量7.0 kg,母羊平均剪毛量4.0 kg。

5.3 繁殖性能

性成熟:公羊8月龄,母羊6月龄;母羊9月~11月龄即可进行第一次配种;母羊发情周期平均17 d,发情持续期24 h~48 h,妊娠期平均148 d,经产母羊产羔率140%~160%之间。在良好的饲养管理条件下,可达到常年发情,二年三产。单羔平均初生重:公羔4.6 kg,母羔4.3 kg;双羔平均初生重:公羔4.1 kg,母羔3.4 kg。

6 分级鉴定

6.1 等级评定

6.1.1 特、一级

外貌特征、生产性能均符合该品种标准要求,且体高、体长、胸围、体重、产毛量五项指标均符合表2要求的羊评定为一级。在一级羊中其体高、体长、胸围指标有一项超过一级羊标准15%或体重、产毛量有一项超过一级羊标准10%评定为特级。

一级羊生产性能见表2。

表2 巴美肉羊一级羊生产性能表

| 月龄   | 性别 | 体高<br>cm | 体长<br>cm | 胸围<br>cm | 体重<br>kg | 产毛量<br>kg |
|------|----|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 12月龄 | 公羊 | ≥72.0    | ≥73.0    | ≥105.0   | ≥70.0    | ≥4.0      |
|      | 母羊 | ≥67.0    | ≥68.0    | ≥90.0    | ≥50.0    | ≥3.3      |
| 24月龄 | 公羊 | ≥78.0    | ≥80.0    | ≥115.0   | ≥100.0   | ≥7.0      |
|      | 母羊 | ≥70.0    | ≥71.0    | ≥95.0    | ≥60.0    | ≥4.0      |

6.1.2 二级

外貌特征、生产性能均符合该品种标准要求,且体高、体长、胸围、体重、产毛量五项指标均符合表3要求的羊评定为二级。

二级羊生产性能见表3。



表 3 巴美肉羊二级羊生产性能表

| 月龄    | 性别 | 体高<br>cm | 体长<br>cm | 胸围<br>cm | 体重<br>kg | 产毛量<br>kg |
|-------|----|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 12 月龄 | 公羊 | ≥68.0    | ≥69.0    | ≥100     | ≥68.0    | ≥3.5      |
|       | 母羊 | ≥64.0    | ≥65.0    | ≥90.0    | ≥48.0    | ≥3.0      |
| 24 月龄 | 公羊 | ≥74.0    | ≥76.0    | ≥108.0   | ≥96.0    | ≥6.5      |
|       | 母羊 | ≥67.0    | ≥67.0    | ≥92.0    | ≥58.0    | ≥3.5      |

### 6.1.3 等外

凡不符合以上等级标准的个体,均列为等外。

### 6.2 鉴定时间

每年剪毛前进行等级鉴定,一般在 3 月中下旬至 4 月中下旬。

## 7 生产性能测定方法

生产性能测定方法按照 NY/T 1236 的规定执行。



附 录 A  
(资料性附录)  
巴美肉羊体型外貌照片

A.1 巴美肉羊公、母羊正面见图 A.1 和图 A.2。



图 A.1 公羊正面图



图 A.2 母羊正面图

A.2 巴美肉羊公、母羊侧面见图 A.3 和图 A.4。



图 A.3 公羊侧面图



图 A.4 母羊侧面图



A.3 巴美肉羊公、母羊后面见图 A.5 和图 A.6



图 A.5 公羊后面图




图 A.6 母羊后面图