



中华人民共和国国家标准

GB/T 24699—2009

四川白鹅

Sichuan white goose

2009-11-30 发布

2010-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位：四川省畜禽繁育改良总站、南溪县畜牧兽医局、南溪县四川白鹅育种场。

本标准主要起草人：马敏、李强、杨仕光、叶远清、赵开云。

四川白鹅

1 范围

本标准规定了四川白鹅的特性特征、体重和体尺、繁殖性能、肉用性能及测定方法。
本标准适用于四川白鹅品种。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量统计方法

3 品种特性

四川白鹅具有生长速度快、繁殖性能优良、就巢性弱、遗传性能稳定、配合力好等特点。在中型鹅种中以产蛋量高而著称。

4 外貌特征

四川白鹅体型中等，羽毛白色、紧密、富有光泽。喙、胫、蹼呈橙黄色，眼睑椭圆形，虹彩蓝灰色。公鹅头颈粗，体躯长，额部有一个半圆形橙黄色肉瘤，咽袋不明显，成年公鹅图片参见附录 A 中的图 A. 1；母鹅头清秀、颈细长，肉瘤不明显，少数有腹褶，成年母鹅图片参见附录 A 中的图 A. 2。雏鹅羽毛金黄色。

5 体重和体尺

四川白鹅成年体重和体尺见表 1。

表 1 四川白鹅成年体重和体尺(300 日龄)

项 目	公 鹅	母 鹅
体重/g	4 000.0~4 800.0	3 700.0~4 300.0
体斜长/cm	26.7~35.0	25.2~31.6
半潜水长/cm	60.0~76.4	55.0~70.0
颈长/cm	24.6~32.0	23.0~29.5
龙骨长/cm	15.8~21.8	13.5~18.2
胸宽/cm	10.5~12.8	9.0~12.4
胸深/cm	8.8~11.0	7.8~10.8
髌骨宽/cm	7.0~10.0	6.9~9.5
胫长/cm	8.8~11.8	8.0~11.0
胫围/cm	5.5~6.5	4.8~6.1

6 繁殖性能

四川白鹅繁殖性能见表 2。

表 2 四川白鹅繁殖性能

项 目	范 围
开产日龄/d	220~240
65 周龄产蛋量/个	60~80
平均蛋重/g	135~140
蛋壳颜色	白色
公母比例	1:4~1:5
受精率/%	≥85
受精蛋孵化率/%	≥87

7 肉用性能

7.1 生长速度

在放牧加补饲条件下,四川白鹅生长速度见表 3。

表 3 四川白鹅生长速度

项 目	体 重
初生/g	75.0~95.0
28 日龄/g	880.0~1 130.0
56 日龄/g	2 450.0~2 870.0
70 日龄/g	3 000.0~3 600.0

7.2 屠宰性能

四川白鹅 70 日龄屠宰性能见表 4。

表 4 四川白鹅 70 日龄屠宰性能

项 目	公 鹅	母 鹅
宰前活重/g	3 200.0~3 600.0	3 000.0~3 350.0
屠宰率/%	85.7~89.0	84.2~87.2
半净膛率/%	76.0~79.4	73.0~76.5
全净膛率/%	66.5~69.5	64.0~68.5
胸肌率/%	9.5~11.0	8.0~10.5
腿肌率/%	17.2~19.2	16.9~18.9
皮脂率/%	15.0~18.0	15.8~18.9

8 测定方法

四川白鹅体重和体尺、繁殖性能、肉用性能的测定按 NY/T 823 的规定执行。

附 录 A
(资料性附录)
四川白鹅照片

A.1 四川白鹅公鹅见图 A.1。



图 A.1 四川白鹅(公)

A.2 四川白鹅母鹅见图 A.2。



图 A.2 四川白鹅(母)
