




中华人民共和国国家标准

GB/T 26617—2011

皖 西 白 鹅

Wanxi white goose

2011-06-16 发布

2011-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位：安徽省标准化研究院、安徽省皖西白鹅原种场、合肥富安生物科技有限公司。

本标准主要起草人：耿天霖、丁昌东、袁绍有、田素润、刘春喜、胡厚如、郝大丽、彭克森、陈泽儒、吴倩、胡恒龙。

皖 西 白 鹅

1 范围

本标准规定了皖西白鹅的术语和定义、外貌特征特性、生长性能、繁殖性能、屠宰性能、羽绒性能、种蛋性状要求。

本标准适用于皖西白鹅品种。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 17685 羽绒羽毛

NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量统计方法

3 术语和定义

GB/T 17685、NY/T 823 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

皖西白鹅 Wanxi white goose

原产于安徽省西部丘陵山区和河南省固始一带,主要分布于皖西的霍丘、寿县、六安等县市的鹅品种,是我国特有的优良中型肉羽兼用型鹅品种之一。

4 外貌特征特性

羽毛洁白,体型细致紧凑,颈长成弓形。胸深广,背宽平。虹彩灰蓝色。喙扁阔,呈橘黄色。头顶有橘黄色肉瘤,光滑无皱褶。公鹅肉瘤大而突出,颈粗长有力。母鹅颈较细短。8%~10%的鹅颌下带有咽袋。4%~7%的鹅头顶有凤头。60%~70%鹅头顶部与眼周围有灰毛斑点。20%~30%背部有灰毛斑点。95%~98%有腹褶。跖蹼橘红色。外貌形态特征参见附录 A。

雏鹅绒毛淡黄色,雏鹅喙为淡黄色,胫、蹼均为橘黄色。

5 生长性能

5.1 体重

各阶段日龄的体重见表 1。

表 1 各阶段日龄的体重

日 龄	体 重	
	g	
	公	母
0	100~110	95~105
15	305~325	285~315
30	1 250~1 400	1 210~1 350
60	3 470~3 850	3 240~3 580
80	3 700~4 200	3 400~3 900
90	4 500~5 000	4 000~4 600
110	5 200~5 800	4 400~5 000
240	6 000~7 500	5 500~7 000

5.2 成年鹅体重体尺

300 日龄成年公、母鹅体重及体尺见表 2。

表 2 300 日龄成年公、母鹅体重及体尺

性别	体重 g	体斜长 cm	胸宽 cm	胸深 cm	龙骨 cm	髌骨宽 cm	胫长 cm	胫围 cm	半潜水长 cm	颈长 cm
公	6 400~ 7 000	30.5~ 32.0	10.3~ 10.8	10.5~ 11.5	18.5~ 20.0	11.0~ 11.6	7.6~ 8.2	5.6~ 6.2	85.0~ 94.5	38.5~ 40.0
母	6 100~ 6 300	29.0~ 30.0	9.6~ 10.5	10.0~ 10.7	17~ 20.5	10.6~ 11.0	7.0~ 7.5	5.5~ 6.3	78.2~ 86.5	36.5~ 37.5

6 繁殖性能

6.1 生殖性能

生殖性能见表 3。

表 3 生殖性能

项 目	指 标
开产日龄/日龄	205~215
受精率/%	85~90
受精蛋孵化率/%	76~80
健雏率/%	96~99
年产蛋数/个	20~32
公母配比	1 : 4



表 3（续）

项 目	指 标
公母性成熟/日龄	150～180
初配年龄/日龄	240～270
种鹅使用年限/年	公:3～4 母:4～5

6.2 就巢性

母鹅就巢性强。每年就巢 2 次～3 次,就巢率占 95%～97%。

7 屠宰性能

90 日龄屠宰性能见表 4。

表 4 90 日龄屠宰性能

项 目	公	母
屠宰率/%	85～90	85～90
半净膛率/%	74～78	76～80
全净膛率/%	66～70	68～71
胸肌率/%	13～17	12～16
腿肌率/%	10～15	9～14

8 羽绒性能

产羽绒性能见表 5。

表 5 产羽绒性能

项 目	120 日龄	240 日龄	种鹅
产羽量/g	245～270	320～380	400～450
产绒量/g	30～40	40～50	60～120

9 种蛋性状

蛋重:135 g～150 g。蛋壳白色,蛋壳厚度 0.58 mm～0.60 mm,畸形蛋不能做种蛋用。蛋形指数为 1.44～1.50。



附 录 A
(资料性附录)
皖西白鹅形态特征图片

A.1 皖西白鹅公鹅




图 A.1 皖西白鹅公鹅

A.2 皖西白鹅母鹅




图 A.2 皖西白鹅母鹅

A.3 皖西白鹅公鹅(有咽袋)




图 A.3 皖西白鹅公鹅(有咽袋)

A.4 皖西白鹅母鹅(有咽袋)




图 A.4 皖西白鹅母鹅(有咽袋)

A. 5 皖西白鹅公鹅(有凤顶)




图 A. 5 皖西白鹅公鹅(有凤顶)

A. 6 皖西白鹅母鹅(有咽袋、有凤顶)




图 A. 6 皖西白鹅母鹅(有咽袋、有凤顶)