

## 天长三黄鸡商品代饲养管理技术规程

Technical regulations for feeding and management of commercial Tianchang Yellow Chicken

地方标准信息服务平台

2023 - 03 - 01 发布

2023 - 04 - 01 实施



## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽农业大学提出。

本文件由安徽省农业农村厅归口。

本文件起草单位：安徽农业大学、天长市动物疫病预防与控制中心、天长市金羽禽业有限公司、滁州市动物疫病预防与控制中心、安徽省畜禽遗传资源保护中心。

本文件主要起草人：郭兴、黄媛媛、周铭生、涂小璐、席海龙、姜润深、阮祥春、倪少江、叶圣山、陶金萍、朱平生、许文文、夏庆泰、张燕、程悦、刘彩霞、刘驰。

地方标准信息服务平台



# 天长三黄鸡商品代饲养管理技术规程

## 1 范围

本文件规定了天长三黄鸡商品代雏鸡的引进和质量、饲养条件、育雏期饲养管理、育成至出栏期饲养管理、卫生防疫和档案管理。

本文件适用于天长三黄鸡商品代的饲养管理。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 13078 饲料卫生标准  
NY/T 388 畜禽场环境质量标准  
NY/T 682 畜禽场场区设计技术规范  
NY/T 1167 畜禽场环境质量及卫生控制规范  
NY/T 1168 畜禽粪便无害化处理技术规范  
NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质  
NY/T 5030 无公害农产品 兽药使用准则  
NY/T 5339 无公害农产品 畜禽防疫准则  
DB34/T 13 天长三黄鸡  
《中华人民共和国兽药典》（2020版）  
《病死及病害动物无害化处理技术规范》 农医发〔2017〕25号

## 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 雏鸡的引进和质量

### 4.1 雏鸡的引进

雏鸡应从具有《种畜禽生产经营许可证》和《动物防疫条件合格证》的天长三黄鸡种鸡场引进。

### 4.2 雏鸡的质量

雏鸡符合 DB34/T 13 的要求，健康且检疫合格。

## 5 饲养条件

### 5.1 场址选择

鸡场场址应远离主干道、居民生活区、工厂集中地以及畜禽贸易场所，鸡场周围无污染、无噪音，地形开阔、平整或有一定坡度，排水顺畅，布局应符合 NY/T 682 的要求，生态环境质量及卫生符合 NY/T 1167 的要求。

## 5.2 鸡舍要求

5.2.1 鸡舍建筑宜采用砖混或钢结构，隔热保温性能良好。

5.2.2 鸡舍内地面、墙面和屋顶平整、耐腐蚀。

5.2.3 舍内环境质量符合 NY/T 388 的要求。

## 5.3 设施设备

5.3.1 鸡舍应配备加温和通风设备，配套开食盘、料桶、饮水器等器具，每 50 只雏鸡配备 1 个开食盘、1 个 2.5 L 的饮水器；每 50 只育成鸡配备 1 个 5 kg 的料桶、1 个 5 L 的饮水器。

5.3.2 放养鸡舍内宜设置栖架，产蛋期每 5 只~10 只母鸡配备一个产蛋窝。

5.3.3 笼养时需准备鸡笼及配套的自动饮水、饲喂、清粪等相关设施设备。

## 5.4 运动场

鸡舍外运动场面积应达鸡舍内面积 2 倍以上，运动场宜种植乔木或藤蔓类植物，宜搭建遮阳网，并配置栖架和沙浴池。

## 5.5 饮水和饲料

5.5.1 饮用水质应符合 NY 5027 的要求。

5.5.2 饲料和饲料添加剂应符合 GB 13078 的要求，推荐日粮营养水平参考附录 A。

## 6 育雏期饲养管理

### 6.1 饲养方式

育雏期为出生雏至 6 周龄，可采用地面垫料平养、网上平养或笼养。

### 6.2 育雏准备

6.2.1 进雏前，应对育雏区及养殖用具进行清扫、清洗和消毒。

6.2.2 雏鸡入舍前，将舍内温度保持在 33℃~35℃，湿度保持在 50%~70%。

### 6.3 饮水与饲喂

6.3.1 雏鸡先饮水，后开食。

6.3.2 雏鸡应在出雏后 24 小时内开饮，饮水中可添加葡萄糖和复合维生素，自由饮水。

6.3.3 开饮后即可开食，少喂勤添，每日饲喂 3 次~6 次，自由采食。

### 6.4 温度和光照

育雏期的温度和光照时间应符合表1 的要求，光照强度 15 Lx~20 Lx。

表1 育雏期的温度和光照时间

| 日龄<br>(d) | 舍内温度<br>(℃) | 光照时间<br>(h) |
|-----------|-------------|-------------|
| 1~2       | 33~35       | 24          |
| 3~7       | 32~34       | 22          |
| 8~14      | 29~31       | 20          |
| 15~21     | 28~30       | 18          |
| 22~28     | 25~28       | 16          |
| 29~35     | 21~24       | 16          |
| 36~42     | 20          | 16          |

6.5 饲养密度

育雏期的饲养密度应符合表2 的要求。

表2 育雏期的饲养密度

| 周龄<br>(wk) | 舍内密度<br>(只/m <sup>2</sup> ) |
|------------|-----------------------------|
| 1~2        | 25~50                       |
| 3~4        | 20~25                       |
| 5~6        | 15~20                       |

6.6 分群

随着鸡的生长，适时大小分群饲养。

7 育成至出栏期饲养管理

7.1 饲养周期

育成期自 7 周龄开始。公鸡宜 100 日龄~120 日龄出栏。母鸡宜 120 日龄~150 日龄出栏，也可饲养至产蛋高峰期后出栏。

7.2 饲养方式

采用舍内地面垫料平养和运动场放养相结合，适时公母分群饲养。

7.3 饮水与饲喂

自由饮水与采食，每日饲喂 2次~3次。

7.4 温度和光照

舍内最适温度为 15℃~25℃，自然光照。

7.5 饲养密度

育成至出栏期的饲养密度应符合表3 的要求。

表3 育成至出栏期的饲养密度

| 周龄<br>(wk) | 舍内密度<br>(只/m <sup>2</sup> ) |
|------------|-----------------------------|
| 7~8        | 12~15                       |
| 9~15       | 10~12                       |
| 16~出栏      | 6~10                        |

7.6 母鸡产蛋期饲养管理

- 7.6.1 自 18 周龄起，早晚补充光照，逐渐延迟光照时间，直至产蛋高峰期时每天光照时间达 15 h~16 h。
- 7.6.2 饲料营养水平见附录 A。
- 7.6.3 每天及时收集鸡蛋。

8 卫生防疫

8.1 卫生管理

- 8.1.1 鸡场应相对封闭，严禁非工作人员进入生产区。
- 8.1.2 鸡场和鸡舍入口处设消毒池，做好鸡场进出车辆、人员以及鸡舍内外人员、物品、用具、鸡群的消毒工作。消毒应符合 NY/T 5339 的要求。
- 8.1.3 每周带鸡消毒 1 次~2 次，每周对运动场消毒 1 次。
- 8.1.4 消灭蚊蝇和昆虫，定期灭鼠。

8.2 疫病防治

- 8.2.1 免疫接种：重点做好马立克氏病、新城疫、传染性支气管炎、传染性法氏囊病、禽流感、鸡痘等重要疫病的疫苗接种，推荐免疫接种程序见附录 B。出栏前 1 个月应停止免疫。
- 8.2.2 每日观察鸡群健康状况，对病情较轻、可治愈的病鸡进行隔离治疗和饲养。
- 8.2.3 兽药使用应符合 NY/T 5030 和《中华人民共和国兽药典》的要求，并严格执行休药期。
- 8.2.4 鸡群应做好球虫病等寄生虫病的防治，定期对场区和鸡舍进行消毒。
- 8.2.5 发生动物疫情按规定上报。

8.3 废弃物处理

- 8.3.1 粪便、污水等废弃物处理按 NY/T 1168 的规定执行。
- 8.3.2 病死鸡处理按《病死及病害动物无害化处理技术规范》进行无害化处理。

9 档案管理

建立养殖档案，做好全期生产记录。包括进雏日期、存栏数、死淘数、采食量、阶段体重、免疫接种、消毒、发病及用药等记录，养殖档案应至少保存 2 年。



附 录 A  
(资料性)

天长三黄鸡推荐日粮营养水平

表A.1 天长三黄鸡推荐日粮营养水平

| 项 目                | 0~30日龄      | 30~60日龄     | 60~120日龄    | 120日龄以上母鸡产蛋期 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 代谢能 (MJ/kg)        | 11.50~11.70 | 10.80~11.00 | 10.40~10.60 | 10.80~11.00  |
| 粗蛋白质 (%)           | 18.0~20.5   | 15.0~18.0   | 14.0~17.0   | 15.0~17.0    |
| 粗纤维 (%) ≤          | 6.0         | 7.0         | 7.0         | 7.0          |
| 粗灰分 (%) ≤          | 8.0         | 8.0         | 8.0         | 16.0         |
| 赖氨酸 (%) ≥          | 0.90        | 0.75        | 0.70        | 0.75         |
| 蛋氨酸 (%) ≥          | 0.40        | 0.32        | 0.30        | 0.35         |
| 苏氨酸 (%) ≥          | 0.63        | 0.51        | 0.48        | 0.45         |
| 钙 (%)              | 0.80~1.10   | 0.60~1.10   | 0.50~1.00   | 2.00~3.50    |
| 总磷 (%)             | 0.45~0.75   | 0.40~0.70   | 0.40~0.70   | 0.40~0.70    |
| 氯化钠 (%) (以可溶性氯化物计) | 0.30~0.80   | 0.30~0.80   | 0.30~0.80   | 0.30~0.80    |

注1：总磷含量已经考虑了植酸酶的使用；  
注2：表中蛋氨酸的含量为蛋氨酸或蛋氨酸+蛋氨酸羟基类似物及其盐折算为蛋氨酸的含量。

地方标准信息服务平台

附录 B  
(资料性)

天长三黄鸡推荐免疫接种程序

表B.1 天长三黄鸡推荐免疫接种程序

| 日龄<br>(d) | 疫苗名称                      | 接种剂量   | 接种方法  | 备注   |
|-----------|---------------------------|--------|-------|------|
| 1         | 马立克氏病疫苗<br>(MD)           | 0.2 mL | 皮下注射  |      |
| 7         | 新城疫-传染性支气管炎二联苗<br>(ND-IB) | 1 羽份   | 点眼/滴鼻 |      |
|           | 新城疫-禽流感二联苗<br>(ND-H9)     | 0.3 mL | 颈皮下注射 |      |
| 12~14     | 鸡传染性法氏囊苗<br>(IBD)         | 1 羽份   | 滴口/饮水 |      |
| 21        | 鸡禽流感苗<br>(H5+H7)          | 0.5 mL | 颈皮下注射 |      |
|           | 新城疫-传染性支气管炎二联苗<br>(ND-IB) | 1 羽份   | 点眼/滴鼻 |      |
| 28        | 鸡痘疫苗<br>(POX)             | 1 羽份   | 翅膜刺种  |      |
| 49        | 新城疫-禽流感二联苗<br>(ND-H9)     | 0.5 mL | 肌肉注射  |      |
|           | 新城疫-传染性支气管炎二联苗<br>(ND-IB) | 1.5 羽份 | 点眼/滴鼻 |      |
|           | 鸡禽流感苗<br>(H5+H7)          | 0.5 mL | 肌肉注射  |      |
| 84        | 新城疫-传染性支气管炎二联苗<br>(ND-IB) | 1.5 羽份 | 点眼/滴鼻 | 母鸡选做 |
| 126       | 新城疫-传染性支气管炎二联苗<br>(ND-IB) | 1.5 羽份 | 点眼/滴鼻 | 母鸡选做 |