

湘黄鸡养殖场兽药使用技术规程

Technical specification for use of veterinary drugs
in Xianghuang chicken farms

2022 - 07 - 08 发布

2022 - 10 - 08 实施

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 用药原则 1

5 兽药使用 1

 5.1 生物制品 1

 5.2 驱虫药 2

 5.3 消毒药 2

 5.4 抗菌药 2

 5.5 其他兽药 2

6 兽药废弃物处理 2

7 兽药使用档案记录 2

附录 A（资料性） 湘黄鸡养殖场预防用药 3

附录 B（资料性） 湘黄鸡养殖场常用抗球虫药 4

附录 C（资料性） 兽药使用记录 6

参考文献 7

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草起草单位：衡阳县兴鸿畜牧业有限公司、耒阳市畜牧水产事务中心、衡阳子园生态农业有限责任公司、耒阳温氏禽畜有限公司、衡阳市农业农村局、衡阳县畜牧水产事务中心、邵阳县畜牧水产事务中心、安化县梅城镇农业综合服务中心、湖南环境生物职业技术学院。

本文件主要起草人：郑四清、胡国平、丰艳平、李丽平、杨彩霞、刘双喜、任勇君、黄从菊、蒋小玲、刘吉荣、倪婷、罗鹏、郭佑勋、张永勇、李万军、王琴、雷明、蒋宏秋、许建军、张小亮、贺矿才、姜亚东、许美解。

湘黄鸡养殖场兽药使用技术规程

1 范围

本文件规定了湘黄鸡养殖场兽药使用的用药原则、兽药使用、兽药废弃物处理、兽药使用档案记录的要求。

本文件适用于湘黄鸡养殖场的兽药使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 25886 养鸡场带鸡消毒技术要求
- GB 31650 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量
- NY/T 3075 畜禽养殖场消毒技术
- NY/T 3445 畜禽养殖场档案规范
- DB43/T 547 湘黄鸡饲养管理技术规程
- DB43/T 780 黄郎鸡（湘黄鸡）种鸡饲养管理技术规程
- DB43/T 1534 肉鸡养殖场兽药使用技术规程
- DB43/T 2218 蛋鸡养殖场兽药使用技术规范

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 用药原则

- 4.1 采购、运输、入库、贮存、出库应按 DB43/T 1534、DB43/T 2218 的规定执行。
- 4.2 使用兽药应严格遵守《兽药管理条例》、《中华人民共和国兽药典（2020 版）》以及兽药产品说明书的规定；严格执行兽药休药期和 GB 31650、DB43/T 1534、DB43/T 2218 中的“限用、禁用和不得使用”规定。不得超范围、超剂量、超疗程用药。
- 4.3 应根据疾病诊断结果，采取最大药效和最小风险、较少药物种类的原则，科学制订用药计划，避免配伍禁忌。
- 4.4 湘黄鸡养殖场预防用药见附录 A。

5 兽药使用

5.1 生物制品

5.1.1 肉用湘黄鸡养殖场参照 DB43/T 547 的规定、种用湘黄鸡养殖场参照 DB43/T 780 的规定使用疫苗。

5.1.2 接种马立克氏病疫苗时，应选择鸡马立克氏病 CVI988 株活疫苗（液氮苗），不能使用鸡马立克氏病火鸡疱疹病毒活疫苗（冻干苗）。

5.1.3 12 周龄~14 周龄应在翅内侧无血管处皮下刺种 1 羽份禽脑脊髓炎、鸡痘二联活疫苗。接种后 7 d~10 d 查看刺种处皮肤上是否有绿豆大小结节或干痂，没有接种结节或干痂反应的应重新接种疫苗。

5.2 驱虫药

5.2.1 科学选用寄生虫防治药物，注意轮换用药、穿梭用药。

5.2.2 库蠓、蚋等吸血昆虫和鸡螨、鸡虱等鸡体表寄生虫易发季节，每周应选用安全、高效的杀虫剂喷雾包括但不限于鸡群、鸡舍及其放养场地 1 次。

5.2.3 球虫病高发季节，应选择敏感高效的抗球虫药进行预防或治疗。用药 1 d 后未见症状明显减轻时，应及时换用另一类别的抗球虫药。湘黄鸡养殖场常用抗球虫药见附录 B。

5.2.4 60 日龄后应选用广谱、高效、低毒的抗蠕虫（包括线虫、绦虫、吸虫等）药驱虫，隔 40 d 左右进行第二次驱虫；驱虫前应进行药物安全试验。

5.2.5 组织滴虫病发生时，应立即使用地美硝唑等抗组织滴虫药进行治疗。

5.2.6 鸡住白细胞虫病发生时，应用磺胺间甲氧嘧啶钠可溶性粉或磺胺氯吡嗪钠可溶性粉混饮或混饲进行治疗，连用 3 d~5 d。

5.3 消毒药

5.3.1 应按 NY/T 3075 的规定选择和使用消毒药，带鸡消毒应符合 GB/T 25886 的规定。

5.3.2 放养场地应每周消毒 1 次。

5.4 抗菌药

应符合 DB43/T 1534、DB43/T 2218 的规定。

5.5 其他兽药

5.5.1 实施断喙、阉割、转群、免疫等应激操作前后 3 d，在饲料或饮水中添加电解质多种维生素（包括但不限于维生素 K、维生素 E、维生素 AD、B 族维生素、硒等微量元素）制剂、中兽药制剂等。

5.5.2 天气变化时，变冷补充多种维生素制剂、变热投服小苏打等电解质制剂和防暑中兽药制剂。

5.5.3 放养湘黄鸡前应使用高效、低毒灭鼠药对放养场地进行灭鼠。

6 兽药废弃物处理

按 DB43/T 1534、DB43/T 2218 的规定执行。

7 兽药使用档案记录

按 NY/T 3445 的规定执行。兽药使用记录表见附录 C。

附 录 A
(资料性)
湘黄鸡养殖场预防用药

表 A.1 湘黄鸡养殖场预防用药

日龄	预防疾病	预防用药	使用方法
1~3	应激, 防止脱水和开食前体能过耗	葡萄糖+电解质多种维生素预混剂饮水	按兽药产品说明书和内包装标签的规定使用
2~6	白痢、支原体	酒石酸泰万菌素预混剂或蒽诺沙星可溶性粉饮水	
8~12	慢性呼吸道疾病	酒石酸泰乐菌素可溶性粉+盐酸多西环素可溶性粉饮水	
13~17	球虫病	地克珠利溶液/磺胺氯吡嗪钠或磺胺喹噁啉钠可溶性粉饮水	
35~40	滑液囊支原体	盐酸金霉素可溶性粉饮水	
52~56	慢性呼吸道疾病	酒石酸泰万菌素预混剂+盐酸多西环素可溶性粉饮水	
63	驱杀线虫、吸虫、绦虫等	阿维菌素阿苯达唑预混剂拌料内服	
71~75	支原体	酒石酸泰万菌素预混剂饮水	

注: ①根据各场的疫病流行与控制的实际需要调整预防用药, 做到能不用药就不用、能少用药决不多用;

②接种鸡球虫病活疫苗的育雏过程中禁用抗球虫药。

附录 B

(资料性)

湘黄鸡养殖场常用抗球虫药

表 B.1 湘黄鸡养殖场常用抗球虫药

类别	名称	用法与用量	休药期	注意事项
三嗪类	地克珠利预混剂	混饲：地克珠利 1 mg/kg 饲料		①产蛋期禁用；②需连续用药，但连用不得超过6个月；③注意用药人护眼护肤
	地克珠利颗粒	混饮：地克珠利颗粒（170 mg～340 mg）/L 水		
	地克珠利溶液	混饮：地克珠利（0.5 mg～1 mg）/L 水，现配现用		
聚醚类 离子载体 抗球虫药	莫能菌素预混剂	混饲：莫能菌素（90 mg～110 mg）/kg 饲料	5 d	①产蛋期禁用；②大于 16 周龄鸡禁用
	盐霉素预混剂	混饲：盐霉素60 mg/kg饲料		
	盐霉素钠预混剂			
	甲基盐霉素钠预混剂	混饲：甲基盐霉素（60 mg～800 mg）/kg 饲料（用药鸡粪对鱼类有毒）		①产蛋期禁用；②不得与泰妙菌素、竹桃霉素及其他抗球虫药合用；③安全范围窄，应严控混饲浓度
	甲基盐霉素尼卡巴嗪预混剂	混饲：本品（375 mg～625 mg）/kg 饲料		
	拉沙洛西钠预混剂	混饲：拉沙洛西（75 mg～125 mg）/kg 饲料	3 d	产蛋期禁用
	马度米星胺预混剂	混饲：本品 500 mg/kg 饲料（用药剂量应精确，用药鸡粪不可作饲料原料）	5 d	
	马度米星胺尼卡巴嗪预混剂	混饲：本品 500 mg/kg 饲料，连用 5 d～7 d	7 d	①产蛋期禁用；②高温季节慎用
	海南霉素钠预混剂	混饲：本品（500 mg～750 mg）/kg 饲料（用药鸡粪不可作饲料原料、不能污染水源）		产蛋期禁用
二硝基类	二硝托胺预混剂	混饲：二硝托胺（极微粉末）125 mg/kg 饲料或本品 500 mg/kg 饲料	3 d	产蛋期禁用；应控制剂量连续使用
	尼卡巴嗪预混剂	混饲：尼卡巴嗪（100 mg～125 mg）/kg 饲料（用药鸡产蛋率、受精率、蛋品质下降）	4 d	产蛋期禁用；夏天高温季节慎用
磺胺类	磺胺喹噁啉二甲氧苄啶预混剂	混饲：本品 500 mg/kg 饲料	10 d	产蛋期禁用；连续用药不得超过 5 d
	复方磺胺喹噁啉溶液	混饮：本品（1 ml～2 ml）/L 水，连用 3d～5d		产蛋期禁用
	磺胺喹噁啉钠可溶性粉	混饮：磺胺喹噁啉钠（300 mg～500 mg）/L 水		产蛋期禁用；连续用药不得超过 5 d
	复方磺胺喹噁啉钠可溶性粉	混饮：本品 1000 mg/L 水，连用 3d～5d		产蛋期禁用
	磺胺氯吡嗪钠可溶性粉	混饮：磺胺氯吡嗪钠 300 mg/L 水，连用 3 d；或混饲：磺胺氯吡嗪钠 600 mg/kg 饲料，连用 3 d～5 d	肉用鸡 1 d	产蛋期禁用；饮水给药≤5 d
	复方磺胺氯吡嗪钠粉	P. O.，本品 32 mg）/（kg·bw·d），连用 3 d～6 d	2 d	

表 B.1 湘黄鸡养殖场常用抗球虫药（续）

类别	名称	用法与用量	休药期	注意事项
磺胺类	复方磺胺氯吡嗪钠预混剂	混饲：本品 2000 mg/kg 饲料，连用 3d	1 d	
	磺胺间甲氧嘧啶预混剂	混饲：磺胺间甲氧嘧啶 480 mg/kg 饲料，连用 3 d~7 d	28 d	产蛋期禁用
	复方磺胺间甲氧嘧啶预混剂	混饲：本品（2000 mg~2500 mg）/kg 饲料		
	复方磺胺间甲氧嘧啶钠溶液	混饮：本品 1.0 ml/L 水，连用 3 d~5 d		
	复方磺胺间甲氧嘧啶钠粉	混饮：磺胺间甲氧嘧啶钠（250 mg~500 mg）/L 水，连用 3 d~5 d		
其他	癸氧喹酯干混悬剂	混饲：3%本品（0.5 g~1.0 g）/L 水，连用 7 d	5 d	产蛋期禁用
	盐酸氨丙啉磺胺喹噁啉钠可溶性粉	混饮：本品 500 mg/L 水，连用 3 d~5 d	7 d	产蛋期禁用
	盐酸氨丙啉乙氧酰胺苯甲酯预混剂	混饲：本品 500 mg/kg 饲料（饲料中维生素 B1 含量超过 10 mg，会拮抗本品的抗球虫作用）	3 d	产蛋期禁用
	盐酸氨丙啉乙氧酰胺苯甲酯磺胺喹噁啉预混剂		7 d	产蛋期禁用；连续用药 ≤ 5 d
	氯羟吡啶预混剂	混饲：氯羟吡啶 125 mg/kg 饲料，可连续饲喂至 16 周龄	5 d	产蛋期禁用；能抑制球虫免疫力形成
	盐酸氯苯胍预混剂	混饲：盐酸氯苯胍（30 mg~60 mg）/kg 饲料	5 d	产蛋期禁用；不宜长期或高浓度混饲
	盐酸氯苯胍片	P.O.，本品（1 片~1.5 片）/（kg•bw•次）	5 d	产蛋期禁用；应连续用药

注：①表中数据来源于中国兽药典（2020 版）。②在具体使用每一种兽药时，应严格执行兽药产品说明书的规定、严格执行国家法律法规和政策中新出台的休药期及其他相关规定，确保用药安全。

附 录 C
(资料性)
兽药使用记录

表 C.1 兽药使用记录表

兽药使用单位名称：地址：法人代表：联系电话：

商品 名称	通用 名称	剂型	规格	批准 文号	生产 批号	生产 日期	有效 期	休药 期	群体用药			个体用药		用药 总量	使用 方法	现场 反应	使用 日期	停药 日期	使用 人	备注
									群号	日龄	数量	编号	日龄							

参 考 文 献

- [1] 《兽药管理条例》(2020 年国务院令 第 726 号)
 - [2] 《中华人民共和国兽药典 (2020 版)》
-